

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета ветеринарного
контроля и надзора МСХ РК

« 06 » 06

С.С. Хасенов
2016 г.



НАСТАВЛЕНИЕ

по применению жидкой кормовой добавки «АМИНОВИТАКЕЛ»

(Организация–разработчик «Кела Н.В.», Синт-Ленаарцевег 48, 2320
Хоогстратен, Бельгия/ Kela N.V., St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten,
Belgium).

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Кормовая добавка Аминовитакел (Aminovitakel) для перорального применения представляет собой прозрачную жидкость от оранжевого до темно-красного цвета, содержит в своём составе витамины, аминокислоты и микроэлементы.

Кормовая добавка Аминовитакел предназначена для сбалансирования рационов лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, свиней и домашней птицы.

Кормовая добавка Аминовитакел, благодаря наличию в её составе сбалансированного количества витаминов, микроэлементов и аминокислот, в т.ч. незаменимых, компенсируют дефицит биологически активных веществ в организме животных, нормализует обмен веществ, способствует повышению неспецифической резистентности к неблагоприятным факторам внешней среды.

Кормовая добавка Аминовитакел представляет собой уникальный витаминный стимулятор продуктивности животных и птицы приготовленный на основе водорастворимой формы витаминов А,В,С,Е,Д,К₃, что обеспечивает её высокую биодоступность. Аминовитакел восполняет недостаточность витаминов в организме животных. Комплекс витаминов в составе позволяет стимулировать обмен веществ. Витамин А регулирует строение, функции и регенерацию эпителиальных тканей и тем самым повышает сопротивляемость против инфекции. Повышенные дозы препятствуют снижению веса и повышают обмен веществ. Витамин D₃ регулирует обмен кальция и фосфора и влияет на их всасывание в желудочно-кишечном тракте, обладает противорахитным действием. Витамин Е регулирует окислительно-восстановительные процессы и влияет на углеводно-жировой обмен, усиливает действие витаминов А и D₃. Витамин С является важным фактором нормального роста и повышает защитные функции организма животных.

Кормовую добавку Аминовитакел выпускают в пластиковых канистрах с номинальными объёмами 1 л и 5 л.

В 1000 мл добавки содержится:

Витамин А пропионат	12,000,000 МЕ	Декспантенол	4 г
Витамин D ₃	3,000,000 МЕ	Лизин(гидрохлорид)	2.743 г
Витамин Е ацетат	3.25 г	Валин	2.743 г
Менадион бисульфит		Изолейцин	2.4г
натрия гидрат		Триптофан	686 мг
(Витамин K ₃)	1 г	Треонин	2.057 г
Тиамин HCl (Витамин B1)	2 г	DL-Метионин	1.371 г
Пиридоксин HCl (Витамин B6)	1.25 г	Кальций(хлориддвухводн)	60 мг
Витамин С	3.5 г	Натрий(хлорид)	60 мг
Фолиевая кислота	3.2 мг	Калий(хлорид)	833 мкг
Железо (в виде цитрата	250 мкг	Наполнители	до 1000 мл
аммония)	33 мкг		
Медь (в виде хлорида)	100 мкг		
Цинк (в виде хлорида)			

II. «Порядок применения кормовой добавки».

2.1. Аминовитакел является жидкой кормовой добавкой содержит витамины, минералы, микроэлементы, электролиты и важные питательные элементы, необходимые для здоровья, роста, развития и стрессоустойчивости животных. Аминокислоты являются строительными блоками для белков и незаменимы во время роста и эксплуатации животных. Употребление кормовой добавки Аминовитакел дополняет рацион витаминами, минералами и

аминокислотами, когда существующее кормление животных не может обеспечить повышенную потребность в этих важных компонентах.

2.2. Аминовитакел можно применять животным и птице с первого дня жизни.

Для всех видов животных: перорально в дозе 1 мл на 5 л питьевой воды 5-7 дней подряд;

Лошадям, крупному рогатому скоту, свиньям, овцам и козам также возможно задавать 1мл Аминовитакела на 50 кг веса тела непосредственно в ротовую полость 5-7 дней подряд.

2.3. Целевые виды животных: лошади, крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, все виды домашней и дикой птицы, кролики.

2.4. Никаких побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки не выявлено.

2.5. Добавка совместима с любыми ингредиентами кормов, другими кормовыми добавками и лекарственными препаратами.

2.6. Сроки использования продуктов животноводства и птицеводства после применения кормовой добавки и в случае вынужденного убоя - неограниченны.

2.7. Неиспользованная кормовая добавка или отходы, полученные из этой кормовой добавки, должны быть утилизированы в соответствии с требованиями местного законодательства.

III Условия хранения и срок годности

3.1. Кормовую добавку Аминовитакел хранят в сухом, прохладном месте при температуре не выше 25 °С, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей.

3.2. Срок годности кормовой добавки Аминовитакел с даты производства - 24 месяца.

4. Меры личной профилактики

4.1. При работе с кормовой добавкой следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные для работы с кормовыми добавками.

Инструкция по применению жидкой кормовой добавки АМИНОВИТАКЕЛ разработана организацией-производителем: «Кела Н.В.», Синт- Ленаарцевег 48, 2320 Хегстратен, Бельгия. (Kela N.V., St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgium).