

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Н.А. ВЛАСОВ

25.01.2019

ИНСТРУКЦИЯ  
по ветеринарному применению лекарственного препарата Цималджекс

(Организация-разработчик: VETOQUINOL S.A., Magny-Vernois, 70200 Lure,  
France/ ВЕТОКИНОЛ С.А., Маньи-Вернуа 70200 Люр, Франция)

Номер регистрационного удостоверения: 250-3-7.14-3175 N178U 3-7.14/04358

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
торговое наименование: Цималджекс (Cimalgex®)

международное непатентованное: цимикоксиб

2. Лекарственная форма: таблетки для перорального применения.

Цималджекс содержит в качестве действующего вещества цимикоксиб.  
Лекарственный препарат выпускают в трех модификациях: с содержанием  
цимикоксиба 8 мг, 30 мг и 80 мг. В качестве вспомогательных веществ  
Цималджекс содержит повидон K25, кросповидон, лаурилсульфат натрия,  
макрогол 400, стеарилфумарат натрия, печеночный порошок, лактозу.

3. По внешнему виду Цималджекс представляет собой таблетки от белого до  
белого с бежевым оттенком цвета с коричневыми вкраплениями, продолговатой  
формы с разделительными насечками (делимые).

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий  
хранения – 3 года с даты производства. Неиспользованную часть таблетки  
допускается хранить в блистере не более 2х суток.

Запрещается применять Цималджекс по истечении срока годности.

4. Цималджекс выпускают в таблетках, расфасованных по 8 штук в  
фольгированные блистеры. Блистеры с препаратом упаковывают в картонные  
коробки по 1 блистеру (8 таблеток), 4 блистера (32 таблетки), 18 блистеров (144  
таблетки). Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по  
применению.

5. Цималджекс хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5 до 25°C.
6. Цималджекс следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Цималджекс относится к группе нестероидных противовоспалительных лекарственных препаратов.

10. Механизм действия цимикоксиба связан с подавлением активности циклооксигеназы (ЦОГ-2) – фермента, регулирующего биотрансформацию арахидоновой кислоты в простагландины (ПГ), которые участвуют в развитии воспалительного процесса. Цимикоксиб относится к селективным ингибиторам ЦОГ-2, оказывая действие преимущественно в очаге воспаления. На ЦОГ-1 цимикоксиб влияет в значительно меньшей степени, что обуславливает его минимальное воздействие на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта.

После перорального введения собакам в рекомендованной дозе цимикоксиб быстро всасывается, максимальная концентрация в крови достигается в среднем через 2 часа и сохраняется на протяжении 24 часов; биодоступность в среднем составляет 50-53%, период полувыведения – 1-2 часа. Цимикоксиб частично метаболизируется и выводится из организма преимущественно через кишечник, в меньшей степени через мочевыделительную систему.

По степени воздействия на организм Цималджекс относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

## III. Порядок применения

11. Цималджекс назначают собакам в качестве обезболивающего, противовоспалительного и жаропонижающего средства при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при хирургических вмешательствах и в послеоперационный период.

12. Цималджекс противопоказано применять щенкам в возрасте менее 10 недель; животным массой менее 2 кг, с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, с заболеваниями крови, при почечной и печеночной недостаточности, а также при повышенной индивидуальной чувствительности к лекарственному препарату или его компонентам.

13. При работе с препаратом Цималджекс следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с

лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть тёплой водой с мылом.

Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Цималджекс. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками следует немедленно промыть их большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

14. Цималджекс запрещается применять животным в период беременности и лактации.

15. Цималджекс применяют индивидуально, перорально, независимо от режима кормления, в дозе 2 мг цимикоксиба на 1 кг массы животного один раз в сутки.

Продолжительность лечения:

- при хирургических вмешательствах – однократно, за 2 часа до начала операции;
- в послеоперационный период – ежедневно, в течение 3-7 дней;
- при заболеваниях опорно-двигательного аппарата – ежедневно, в течение 3-6 месяцев, под наблюдением ветеринарного врача.

При необходимости курс лечения повторяют по назначению ветеринарного врача.

16. При применении препарата Цималджекс в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. В редких случаях после применения лекарственного препарата может возникать раздражение слизистой желудка, рвота и диарея, которые исчезают самопроизвольно после отмены приема препарата и обычно не требуют дополнительного вмешательства. Если указанные симптомы не исчезают, следует обратиться к ветеринарному врачу. В случае появления у животного аллергических реакций использование лекарственного препарата прекращают и назначают симптоматическое лечение.

17. При передозировке лекарственного препарата у животных могут наблюдаться расстройства желудочно-кишечного тракта, угнетенное состояние, анорексия.

18. Запрещается применять Цималджекс одновременно с другими нестероидными или стероидными противовоспалительными лекарственными препаратами.

19. Особеностей действия при первом применении Цималджекс и при его отмене не установлено.

20. Следует избегать пропуска приема очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его терапевтической эффективности. При пропуске одной или нескольких доз препарата курс лечения необходимо возобновить в предусмотренных дозировках и схеме применения. Не следует вводить двойную дозу для компенсации пропущенной.

21. Цималджекс не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ВЕТОКИНОЛ С.А., Маньи-Вернуа  
70200 Люр, Франция/ VETOQUINOL  
S.A., Magny-Vernois, 70200 Lure,  
France

ООО «Глобал-Вет»  
111396, г. Москва, ул. Фрязевская, д.  
10, этаж 2, пом. III, К.1