

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата *Больфо® ошейник*

(Организация-разработчик: компания «*Bayer Animal Health GmbH*»
Kaiser-Wilhelm-Allee 10, D-51373 Leverkusen, Германия)

Номер регистрационного удостоверения: *246-3-6,14-2118 НПВU 3-0,2 /01188*

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: *Больфо® ошейник* (*Bolfo® Collar*).

Международное непатентованное наименование: пропоксур.

2. Лекарственная форма: полимерная лента.

Лекарственный препарат в качестве действующего вещества содержит пропоксур: в ошейнике для собак средних и крупных пород – 4,442 г, в ошейнике для собак мелких пород и кошек – 1,234 г, а также вспомогательные вещества: дибутил адипат, диоктил фталат, эпоксидированное соевое масло, стеариновую кислоту, поливинилхлорид и смесь красителей.

3. По внешнему виду *Больфо® ошейник* представляет собой полимерную ленту коричневого цвета с нанесенным номером серии и 2 или 3 петлями для фиксации.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 5 лет со дня производства. Запрещается применение лекарственного препарата *Больфо® ошейник* по истечении срока годности.

4. Выпускают *Больфо® ошейник* для собак крупных и средних пород длиной – 70 см, для собак мелких пород и кошек – 38 см, в герметично закрытых полиэтиленовых пакетах, помещенных поштучно в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят *Больфо® ошейник* в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 30°C.

6. Больфо® ошейник следует хранить в недоступном для детей месте.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Больфо® ошейник относится к группе инсектоакарицидных средств.
10. Пропоксур (2-изопропоксифенил-N-метилкарбамат), входящий в состав препарата, постепенно выделяясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного, оказывая длительное инсектоакарицидное действие на блох и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках.

Пропоксур является активным ингибитором эстеразных систем организма членистоногих, стимулирует гликолиз и тормозит окислительное фосфорилирование, что приводит к нарушению биохимических процессов, парализу и гибели эктопаразитов.

Больфо® ошейник по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых условиях не оказывает местно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия. Токсичен для рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. Больфо® ошейник предназначен для уничтожения блох и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках, а также для защиты животных от их нападения, особенно в теплое время года (в период повышенной активности паразитов).

12. Противопоказанием к применению Больфо® ошейник является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

Больфо® ошейник не следует применять больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, а также щенкам и котятам моложе 3-месячного возраста.

13. При работе с препаратом Больфо® ошейник следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Во время работы с лекарственным препаратом Больфо® ошейник не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Животное с ошейником не следует подпускать к маленьким детям.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать

прямого контакта с препаратом Больфо® ошейник. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Применение ошейника беременным и кормящим животным при необходимости возможно, после консультации с ветеринарным врачом.

15. После вскрытия упаковки ошейник разворачивают, с внутренней стороны удаляют пластиковые перемычки и надевают на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0-1,5 см, затем пропускают свободный конец ленты через петли и излишек срезают.

Непрерывное использование лекарственного препарата Больфо® ошейник обеспечивает защиту животных от иксодовых клещей на протяжении 2,5 месяцев, от блох – на протяжении 4 месяцев.

Действие лекарственного препарата проявляется через несколько часов, учитывая это, применение ошейника следует провести не позднее, чем за 24 часа до предполагаемого выгула животного в местах возможного обитания эктопаразитов (парки, скверы, лес). В редких случаях при применении препарата Больфо® ошейник возможно обнаружение иксодовых клещей на животном, но через 1- 2 дня паразиты самопроизвольно отпадают.

Эффективность препарата зависит от состояния шерстного покрова, поэтому перед его применением животных с жесткой, спутанной или грязной шерстью, рекомендуется тщательно вымыть. Частый контакт с водой может снизить эффективность препарата Больфо® ошейник, поэтому перед купанием или мытьем животного его рекомендуется снять и вновь надеть, после того, как шерсть животного полностью высохнет.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата Больфо® ошейник в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В редких случаях возможны индивидуальные реакции кожи (покраснение, зуд), которые самопроизвольно проходят и не требуют применения лекарственных средств. При случайном попадании частей ошейника внутрь у животного возможны симптомы отравления карbamатами (рвота, расстройство пищеварения, саливация), в этом случае рекомендуется применение средств симптоматической терапии и холинолитиков.

17. При передозировке препарата у некоторых собак могут наблюдаться повышенная саливация, сужение зрачков, рвота, диарея. В этом случае ошейник снимают, животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

18. Не следует применять лекарственный препарат Больфо® ошейник одновременно с другими инсектоакарицидными препаратами для обработки животных.

19. Особеностей действия лекарственного препарата при его первом применении или отмене не выявлено.

20. Больфо® ошейник применяют непрерывно в течение сезона активности паразитов. Следует избегать нарушений режима применения ошейника, так как это может привести к снижению его эффективности.

21. Больфо® ошейник не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH; Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel (Germany).

АО “БАЙЕР”
Москва, 107113, 3-я Рыбинская ул.,
18, стр. 2;
тел. (495) 234-2000

С согласования настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата Больфо® ошейник, утвержденная Россельхознадзором 17.05.2016.