

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора



И. А. ДИКОВ  
18 ДИВ 2015

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению Масла камфорного 10 %  
для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата у животных  
и субклинического мастита у коров в сухостойный период

(Организация-разработчик: ЗАО «НПП «Фармакс», г. Киров)

**I. Общие сведения**

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Масло камфорное 10 % (Oleum camphoratum 10 %).

Международное непатентованное наименование: камфора.

2. Лекарственная форма: масляный раствор для наружного применения.

Масло камфорное 10 % содержит в 100 мл в качестве действующего вещества 10 г камфоры, а в качестве вспомогательного вещества - масло подсолнечное до 100 мл.

По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость желтого цвета с запахом камфоры.

3. Выпускают Масло камфорное 10 % расфасованным в стеклянные флаконы с винтовой горловиной, укупоренные полимерными пробками и закрытые полимерными навинчиваемыми крышками или полимерными навинчиваемыми крышками с контролем вскрытия; или в стеклянные флаконы и бутылки, укупоренные резиновыми пробками и закатанные алюминиевыми колпачками; или в полимерные флаконы, закрытые полимерными навинчиваемыми крышками. Каждая упаковка снабжена инструкцией по применению.

4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0° С до 20° С.

Срок годности Масла камфорного 10 % при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства. Запрещается применять Масло камфорное 10 % по истечении срока годности.

5. Масло камфорное 10 % следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

**II. Фармакологические свойства**

7. Масло камфорное 10 % относится к фармакотерапевтической группе препаратов для лечения опорно-двигательного аппарата у животных.

Масло камфорное 10 % оказывает антисептическое, местное раздражающее, местное анальгезирующее, противовоспалительное действие, улучшает микроциркуляцию в области нанесения. При нанесении на поверхность кожи частично всасывается, подвергается окислению. Продукты окисления соединяются с глюкуроновой кислотой и выводятся почками. Часть камфоры выделяется в неизменном виде легкими и с желчью.

По степени воздействия на организм Масло камфорное 10 % согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам малоопасным (4 класс опасности).

### III. Порядок применения

8. Масло камфорное 10 % применяют животным для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата (артритов, бурситов, миозитов, тендовагинитов, ушибов) и субклинического мастита у коров в сухостойный период.

9. Противопоказанием к применению Масла камфорного 10 % являются нарушения целостности кожного покрова и индивидуальная повышенная чувствительность животного к камфоре.

10. Масло камфорное 10 % назначают наружно в виде растираний. Масло наносят тонким слоем на участок кожи в области воспалительного процесса и легкими массирующими движениями втирают в течение 2–3 минут 1–2 раза в сутки на протяжении 7 - 10 дней в зависимости от тяжести заболевания.

11. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

12. Особенности действия лекарственного препарата при первом применении и его отмене не установлено.

13. Следует избегать нарушения схемы применения препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При случайном увеличении интервала между двумя обработками препаратом, его следует нанести как можно быстрее.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Масла камфорного 10 % в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций применение препарата прекращают и при необходимости назначают животному антигистаминные препараты.

15. Масло камфорное 10 % не следует назначать одновременно с другими лекарственными препаратами для местного применения.

16. Не рекомендуется применение Масла камфорного 10 % перед убоем.

Продукты животноводства, в том числе молоко, можно использовать без ограничений через 48 часов после последнего применения препарата. Молоко, полученное ранее установленного срока, используют после кипячения на корм пушным зверям. В случае вынужденного убоя ранее установленного срока мясо и субпродукты используют на корм зверям.

### IV. Меры личной профилактики

17. При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, необходимо промыть их большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Маслом камфорным 10 %. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в лечебное учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые флаконы (бутылки) из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ЗАО «НПП «Фармакс», Россия, 610033, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7. Адрес места производства: Россия, 610033, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.

Инструкция разработана: ЗАО «НПП «Фармакс», Россия, 610033, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Масла камфорного 10 %, утвержденная Россельхознадзором 24 декабря 2009 года.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения 24-3.14.14-2448 N ПВР-3-1.9/002-78