

15.07.2020

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Стоп-Интим® таблетки для кошек

(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН», 119121, г. Москва,
Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 1А, кв. 74)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-7.15-4219№ПВР-3-6.0/02579

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование – Стоп-Интим® таблетки для кошек (Stop-Intim tablets for cats),
международное непатентованное наименование – мегестрол.
2. Лекарственная форма: таблетки для приема внутрь.

Стоп-Интим® таблетки для кошек содержат в одной таблетке в качестве действующего вещества мегестрола ацетат – 5 мг, а также вспомогательные вещества: целлюлозу микрокристаллическую, лактозу, кальций стеариновокислый, натрия крахмалгликолят (тип А) и кросповидон.

3. По внешнему виду препарат представляет собой плоские таблетки круглой формы, белого цвета с одной разделительной бороздкой на одной стороне таблетки. Допускаются две перпендикулярно расположенные разделительные бороздки на одной стороне таблетки и оттиск логотипа компании (А) на другой стороне таблетки.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства.

Запрещается применять препарат Стоп-Интим® таблетки для кошек по истечении срока годности.

4. Препарат выпускают по 12 и 15 таблеток в полимерных банках с крышками. Каждую единицу первичной упаковки в комплекте с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 2 °С до 25 °С.

6. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Стоп-Интим® таблетки для кошек относятся к гормональным средствам группы эстрогенов.

10. Мегестрола ацетат, входящий в состав препарата, представляет собой синтетическое производное гормона прогестагена, обладает свойством ингибировать секрецию лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов, которые вырабатываются передней долей гипофиза. При использовании препарата до начала эструса (течки) происходит угнетение синтеза эстрогенов фолликулами яичников, что предотвращает развитие морфологических и психофизиологических изменений у самок, связанных с половым циклом. При применении препарата самкам на 2 или 3 день от начала эструса происходит прерывание течки.

У самцов мегестрола ацетат снижает уровень тестостерона в крови и оказывает опосредованное влияние на регуляцию полового поведения и связанные с ней поведенческие реакции, снижая агрессию, беспокойство и повышенную возбудимость у животного.

Мегестрола ацетат легко адсорбируется в кишечнике, биотрансформируется в печени и выводится из организма в виде солей с мочой в течение 1 – 2 суток.

Стоп-Интим® таблетки для кошек по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают гепатотоксического, мутагенного и сенсибилизирующего действия.

III. Порядок применения

11. Стоп-Интим® таблетки для кошек назначают для регуляции половой охоты у кошек, в том числе для задержки и прерывания течки у кошек, снижения половой активности и коррекции поведения у котов.

12. Противопоказанием к применению Стоп-Интим® таблеток для кошек является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе), заболевания мочеполовой системы, опухоли и диабет. Не следует применять препарат неполовозрелым животным.

13. При работе с препаратом Стоп-Интим® таблетки для кошек следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их следует немедленно промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Стоп-Интим® таблетки для кошек. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустые банки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Не допускается применение препарата самкам в период беременности и вскармливания потомства.

15. Стоп-Интим® таблетки для кошек вводят перорально, принудительно на корень языка, за 1 – 2 часа до кормления, с учетом показаний и пола животного.

С целью задержки течки кошкам препарат применяют в период между течками

один раз в неделю в дозе ½ таблетки или один раз в две недели в дозе 1 таблетка (5 мг по ДВ), но не более 18 месяцев подряд. Повторение курса возможно после проявления у кошки нормального физиологического цикла.

С целью прерывания течки кошкам препарат применяют при появлении ее первых признаков (но не позже чем через 3 дня от ее начала) в дозе 1 таблетка (5 мг по ДВ) на животное один раз в день, в течение 5 – 7 дней (до исчезновения признаков течки плюс один день).

Котам для снижения полового возбуждения и коррекции поведения препарат применяют в дозе 1 таблетка (5 мг по ДВ) на животное. Первые 7 дней лекарственное средство дают ежедневно в суточной дозе, последующие 14 дней – ½ суточной дозы.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. У отдельных животных при повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата или при его длительном применении возможны обильное слюнотечение, раздражение кожи, рвота, изменение аппетита, поведенческих реакций и увеличение молочных желез. В этих случаях применение препарата следует прекратить и при необходимости назначить симптоматические средства.

17. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

18. Не рекомендуется совместное длительное применение Стоп-Интим® таблеток для кошек с кортикостероидами. Информация о несовместимости с лекарственными препаратами других фармакологических групп, кормами и кормовыми добавками отсутствует.

19. При первом применении лекарственного препарата у животного могут наблюдаться гиперсаливация и повышенный аппетит.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Стоп-Интим® таблетки для кошек не предназначены для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «Апиценна», Московская область, г. Балашиха, Полтевское шоссе, владение 4.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «Апиценна», Московская область, г. Балашиха, Полтевское шоссе, владение 4.