

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Н.А. ВЛАСОВ  
23.10.2019

ИНСТРУКЦИЯ  
по ветеринарному применению лекарственного препарата  
РАДОСТИН® Антистресс

(организация-разработчик ООО «НВЦ Агроветзащита»,  
Россия, 129329, г. Москва, Игарский проезд, д. 4, стр. 2)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-12.12-0748/1782-3-4.6/01762

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
торговое наименование - РАДОСТИН® Антистресс (RADOSTIN® Antistress);  
международное непатентованное наименование действующих веществ:  
ретинол, тиамин, рибофлавин, цианокобаламин, аскорбиновая кислота,  
холекальциферол, токоферол, биотин, менадиона натрия бисульфит, метионин.

2. Лекарственная форма: раствор для орального применения.

РАДОСТИН® Антистресс содержит в 1 мл в качестве действующих  
веществ: витамин А – 400 МЕ, витамин В<sub>1</sub> – 0,2 мг, витамин В<sub>2</sub> – 0,25 мг, витамин  
В<sub>12</sub> – 1 мкг, витамин С – 5 мг, витамин D<sub>3</sub> – 0,8 МЕ; витамин Е – 1,25 мг, витамин  
Н – 0,01 мкг, витамин К – 0,05 мг, метионин – 0,05 мг, а также вспомогательное  
вещество: воду дистиллированную.

3. Лекарственный препарат представляет собой раствор от желтого до темно-  
оранжевого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий  
хранения – 1 год со дня производства. Запрещается применять РАДОСТИН®  
Антистресс по истечении срока годности.

4. РАДОСТИН® Антистресс выпускают расфасованным по 10, 15, 20 и 25  
мл в полимерные флаконы-капельницы, укупоренные навинчиваемыми  
пластмассовыми крышками; по 100 и 200 мл во флаконы из темного стекла,  
укупоренные резиновыми пробками и обкатанные алюминиевыми колпачками; по  
1 и 5 мл в полимерные пипетки-капельницы из пленки ПВХ/ПЭ. Каждый флакон-  
капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в индивидуальную  
картонную пачку. Пипетки-капельницы упаковывают по 6 или 3 штуки в картонные  
пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в  
защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и  
кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С

6. РАДОСТИН® Антистресс следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. РАДОСТИН® Антистресс относится к комбинированным витаминным препаратам.

10. РАДОСТИН® Антистресс содержит в водорастворимой форме витамины А, В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, В<sub>12</sub>, С, D<sub>3</sub>, Е, Н, К и метионин, которые находятся в физиологически обоснованных соотношениях. Компоненты препарата оказывают синергидное действие на организм птицы, выражающееся в предотвращении последствий стрессовой ситуации, нормализации обмена веществ, повышении резистентности организма, стимуляции роста и развития.

Входящий в состав препарата метионин активирует действие ряда гормонов, витаминов, ферментов.

РАДОСТИН® Антистресс по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

## III. Порядок применения

11. РАДОСТИН® Антистресс применяют для профилактики и лечения гиповитаминозов и нарушений белкового обмена у голубей, декоративных и певчих птиц в период линьки, вакцинации, при стрессах, овариитах, сальпингитах; для повышения поедаемости корма, увеличения яйценоскости и сохранности птенцов, восстановления перьевого покрова.

12. Противопоказанием для применения является индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам лекарственного препарата.

13. При проведении лечебных мероприятий с использованием препарата РАДОСТИН® Антистресс следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом РАДОСТИН® Антистресс. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку). Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. РАДОСТИН® Антистресс можно применять декоративной птице в период яйцекладки.

15. С лечебной целью препарат в дозе 3-8 капель на птицу вносят в корм ежедневно в течение 5 дней. Крупным птицам и попугаям задают по 25 капель препарата с кормом. Через 10 дней курс повторяют.

С профилактической целью препарат раз в месяц добавляют в корм в количестве 3 капель на птицу, крупным птицам и попугаям по 25 капель в течение 3-5 дней.

16. При применении препарата РАДОСТИН® Антистресс в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у птиц, как правило, не наблюдается.

17. Симптомы передозировки лекарственного препарата у птиц не выявлены.

18. РАДОСТИН® Антистресс не следует назначать одновременно с другими витаминными лекарственными препаратами.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении или его отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропуска введения очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить в предусмотренной дозе и схеме применения.

21. РАДОСТИН® Антистресс не предназначен для применения продуктивной птице.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. Центральная, д.1

Наименование и адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. Центральная, д.1

С вступлением в действие настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата Радостин Антистресс, утвержденная Россельхознадзором 23 мая 2012 года.