

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по ветеринарному применению лекарственного препарата  
Превикокс таблетки 57 мг и 227 мг

(Организация-разработчик: «Мериал», 29 авеню Тони Гарнье, 69007, Лион, Франция /  
«Merial», 29 avenue Tony Garnier, 69007, Lyon, France)

Номер регистрационного удостоверения: *280-3-417-3749 N17B4-3-19.11/03541*

**I. Общие сведения**

1. Торговое наименование: Превикокс таблетки 57 мг и 227 мг (Previcox 57 mg and 227 mg tablets).

Международное непатентованное наименование: фирококсиб.

2. Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

Превикокс таблетки в качестве действующего вещества содержит фирококсиб - 57 мг и 227 мг в таблетке), а также вспомогательные вещества: моногидрат лактозы, микрокристаллическую целлюлозу, гидроксипропилцеллюлозу, кроскарамеллозу, коллоидный диоксид кремния, вкусовые и ароматические вещества (ароматизатор со вкусом копченого мяса «Charter Hickory smoke flavor» и карамель), пигменты - желтый и красный оксиды железа.

3. По внешнему виду препарат представляет собой таблетки коричневого цвета, округлой формы, выпуклые, на одной стороне таблетки риска и гравировка «М и дозировка».

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 4 года с даты производства. Неиспользованную половину таблетки допускается хранить в блистере не более 7 дней.

Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока годности.

4. Превикокс таблетки 57 мг и 227 мг выпускают расфасованным по 10 таблеток в блистеры, упакованные по 1, 3 или 18 штук в картонные коробки, или по 60 таблеток в полиэтиленовые флаконы объемом 30 см<sup>3</sup> (для таблеток 57 мг) или 100 см<sup>3</sup> (для таблеток 227 мг), укупоренные навинчивающейся полиэтиленовой крышкой с защитой от вскрытия детьми и упакованные поштучно в картонные коробки. В каждую картонную коробку вложена инструкция по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°C до 30°C.

6. Превикокс таблетки 57 мг и 227 мг следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Превикокс таблетки 57 мг и 227 мг отпускается без рецепта ветеринарного врача.

**II. Фармакологические свойства**

9. Превикокс таблетки 57 мг и 227 мг относятся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов.

10. Фирококсиб, входящий в состав препарата, является селективным ингибитором

циклооксигеназы-2 (СОХ-2), избирательно нарушает образование простагландинов, участвующих в формировании воспалительной реакции, подавляет экссудативную и пролиферативную фазы воспаления. Действует преимущественно в очаге воспаления и практически не влияет на продукцию простагландинов, регулирующих почечный кровоток и целостность слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Оказывает болеутоляющее, противовоспалительное и жаропонижающее действие.

После перорального введения собакам в рекомендованной дозе фирококсиб быстро всасывается, максимальная концентрация в крови достигается через 1,25 часа. Период полувыведения составляет 8 часов. Фирококсиб практически полностью связывается с белками крови, метаболизируется в печени, выводится с желчью через кишечник.

Превикокс таблетки 57 мг и 227 мг по степени воздействия на организм относятся к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают сенсибилизирующего, тератогенного и эмбриотоксического действия.

### III. Порядок применения

11. Превикокс таблетки 57 мг и 227 мг назначают собакам в качестве противовоспалительного, болеутоляющего и жаропонижающего средства при лечении остеоартрозов, а также после ортопедических, стоматологических операций и операций на мягких тканях.

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).

Запрещается применять препарат щенкам до 10-недельного возраста и собакам с массой менее 3 кг, а также животным с желудочно-кишечными кровотечениями, заболеваниями крови, при геморрагическом синдроме и тяжелой форме почечной и печеночной недостаточности.

13. При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

В случае проявления аллергических реакций и/или при случайном попадании Превикокс таблеток 57 мг и 227 мг в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение, имея при себе этикетку или инструкцию по применению препарата.

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей; её помещают в целлофановый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

14. Запрещается применять препарат беременным и лактирующим самкам.

15. Превикокс таблетки 57 мг и 227 мг применяют собакам индивидуально перорально один раз в сутки в дозе 5 мг фирококсиба на 1 кг массы животного в соответствии с таблицей:

Масса собаки (кг)	Количество таблеток на 1 прием	
	Превикокс 57 мг	Превикокс 227 мг
3-5,5	0,5	
5,6 – 10	1	
10,1 – 15	1,5	
15,1-22		0,5
22,1-45		1
45,1-68		1,5
68,1-90		2

Превикокс таблетки 57 мг и 227 мг обладают привлекательным ароматом и вкусом, поэтому охотно поедаются собаками, в случае отказа от препарата его скармливают с кормом.

Продолжительность курса лечения при остеоартрозах зависит от состояния животного и определяется лечащим ветеринарным врачом. Применение препарата более 90 дней следует проводить под регулярным контролем ветеринарного врача.

Для облегчения послеоперационных болей и воспаления при операциях на мягких тканях, ортопедических и стоматологических операциях препарат применяют за 2 часа до начала операции, а затем по необходимости 1 раз в сутки, в течение 2-3 суток.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. Редко у животных возможно раздражение слизистой оболочки желудка, рвота и диарея, в исключительных случаях - нарушения в деятельности центральной нервной системы. Применять препарат следует с осторожностью при почечной и/или печеночной недостаточности.

В случае появления таких симптомов, как рвота, повторяющаяся диарея, скрытая кровь в кале, резкое снижение массы тела, отказ от приема пищи, судороги, аллергические реакции, прием препарата следует немедленно прекратить и обратиться к ветеринарному врачу.

17. При передозировке препарата у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, расстройство желудочно-кишечного тракта, угнетенное состояние.

18. Превикокс таблетки 57 мг и 227 мг не следует применять одновременно с другими нестероидными противовоспалительными средствами и глюкокортикоидами.

19. Особеностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. При пропуске очередной дозы препарата его применение необходимо возобновить в предусмотренной дозировке и по той же схеме.

21. Превикокс таблетки 57 мг и 227 мг не предназначены для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

«Мериял», 4 Шеми дю Кальке, 31000  
Тулуза, Франция /  
«Merial», 4 Chemin du Calquet, 31000  
Toulouse, France

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной владельцем  
регистрационного удостоверения  
лекарственного препарата на принятие  
претензий от потребителя/Импортер

ООО «Берингер Ингельхайм», 125171,  
Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.3

Инструкция по применению Превикокс таблетки 57 мг и 227 мг разработана  
департаментом ветеринарных препаратов ООО «Берингер Ингельхайм» (г. Москва).

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению  
Превикокс таблетки 57 мг и 227 мг, утвержденная заместителем Руководителя  
Россельхознадзора 01 июня 2017 года.